GALA ORTODONCIE

Zavedení kotevního minišroubu, následná péče

Zavedení kotevního minišroubu se provádí v **lokální anestezii**. V některých případech je před zavedením kotevního minišroubu zhotoven rentgenový snímek zamýšlené lokalizace k ozřejmění nejvhodnějšího místa zavedení kotevního minišroubu. V průběhu zavádění ucítíte **tlak**, nikoli ostrou bolest (v případě, že by se bolest objevila, tuto skutečnost oznamte). Celý zákrok trvá do patnácti minut.

Kotevní minišroub i jeho okolí je třeba udržovat v **čistotě** – čistit pomocí měkkého zubního kartáčku. Čištěním zabráníte přerůstání okolních měkkých tkání přes hlavičku minišroubu, případně jeho odhojení – v takovém případě je nezbytné zavést nový minišroub. Hlavička minišroubu může na počátku způsobit otlak sliznice (podobně jako ostatní kovové součásti fixního aparátu) – v tomto případě je vhodné zakrýt hlavičku pomocí **ochranného vosku**. Budete-li po odeznění anestezie pociťovat tlak, ev. mírnou bolest v příslušné oblasti, užijte léky proti bolesti dle potřeby.

Kotevní minišroub bude v ústech ponechán po dobu nezbytnou ke splnění svého účelu, poté bude z úst jednoduše odstraněn.

V případě jakýchkoli potíží se na nás prosím ihned obraťte. Děkujeme Vám za spolupráci.